

茎数は指標値並。中干し・溝切りの徹底を！

1 生育概況（指標値比）

- 「コシヒカリ」の生育は、草丈・茎数・葉色ともに指標値並で推移しています。
- 「こしいぶき」の生育は、草丈はやや長め、茎数はやや多め、葉色は濃くなっています。

6/21 現在の生育
コシヒカリ（指標値比）

草丈：並 (103%)	茎数：並 (101%)	葉数：並 (±0.0葉)	葉色：やや濃い (SPAD値+1.0)
----------------	----------------	-----------------	------------------------

	田植	草丈(cm)			茎数(本)				葉数(葉)			葉色(SPAD)			
		本年	指標比	前年比	本年	指標比	前年比	本年	指標差	前年差	本年	指標差	前年差		
コシヒカリ	下稲塚	5/8	42	111	100	m ² 当たり 468	株当たり 25.3	109	94	9.1	0.3	-0.7	38.4	-0.6	-2.7
	高森	5/17	35	92	83	358	17.4	83	84	8.8	0.0	-0.2	37.4	-1.6	-1.8
	長崎	5/10	40	105	88	378	23.6	88	67	8.6	-0.2	-0.4	41.3	2.3	-0.5
	上百々	5/19	39	102	94	530	34.8	123	136	8.7	-0.1	-0.2	42.8	3.8	0.4
	平均		39	103	91	434	-	101	92	8.8	0.0	-0.4	40.0	1.0	-1.1
	関山	5/30	32	97	96	108	6.7	34	54	6.6	-1.5	-0.4	33.1	-5.9	-5.5
こしいぶき	下稲塚	5/8	37	103	85	455	25.4	126	85	8.9	0.0	-1.0	41.1	0.1	-2.2
	長崎	5/15	35	97	88	271	14.8	75	78	9.3	0.3	0.1	46.6	5.6	3.4
	上百々	5/16	41	113	94	418	26.8	116	96	9.1	0.1	-0.3	43.8	2.8	1.8
	平均		38	106	90	381	-	106	87	9.1	0.1	0.0	43.8	2.8	1.0

2 北陸地方1か月予報（新潟地方气象台 6月17日発表）

- 6月19日から向こう1か月の天候は平年と同様曇りや雨の日が多く、気温はほぼ平年並の見込みです。なお、北陸地方は6月18日頃に梅雨入りしたとみられます。

3 今後の管理

- 梅雨入りで降水量が多くなると予想されます。中干し未実施のほ場は、早急に作業を実施しましょう。
- 中干しは田面に1cm程度のヒビが入るまでしっかりと乾かしましょう。生育が過剰となりやすいほ場では、より強めの中干しを実施してください。
- 迅速なかん水を可能とするため、溝切りは必ず実施してください。切った溝は確実に排水口につなげ、溝がつぶれた場所は切り直しを行いましょう。
- 中干しは出穂期の1か月前までに終了し、間断かん水に移行しましょう。特に「こしいぶき」については中干し終了時期が遅れないようにしまししょう。

次回は6月30日の予定です。

問い合わせ先 上越農業普及指導センター作物担当 (電話025-526-9406)