

令和7年度 糸魚川売れる米づくりコシヒカリ生育情報 No.1

令和7年5月29日
糸魚川農業普及指導センター

1 5月29日現在の生育状況（指標値との比較）

田植え日・調査ほ場	草丈	茎数	葉数
田植え日 5月2～23日 ほ場場所 東海、西川原、東中、榎	やや短～並	並 (ほ場間差大)	並

- 5月連休植えのほ場では、生育は概ね順調となっています。また、5月15日頃の田植えでも分げつが見られます。なお、強風の影響を受けたほ場では、葉先の黄化が見られます。
- 一部では表層剥離、アオミドロの発生が見られます。
- 1か月気象予報（5月22日発表）では、6月20日頃まで平年より気温が高い見込みです。

2 今後の管理について

- 中干し後の水の確保に支障がない地区は、田植え後25～30日頃を目安に、遅れずに中干しを開始しましょう。水の確保に支障がある地区については、水の確保を優先して水管理を行いましょう。
- 田植えが遅いほ場でも、田植え後25日頃を目安に中干しを開始しましょう。
- 土壌のワキ、表層剥離、アオミドロの発生が著しい場合、1～2日間落水して発生を抑えましょう。

3 5月29日のコシヒカリ生育調査結果

調査項目		ほ場場所 (田植日)	指標値 ※	東海 (5月2日)	西川原 (5月4日)	東中 (5月23日)	榎 (5月15日)
草 丈	本年値 (cm)		23	25	25	13	20
	平年比 (%)			89	100	66	79
	指標比 (%)			109	110	57	87
茎 数	茎数 (本/m ²) (一株当たり(本))		85	202 (11.0)	130 (7.4)	74 (4.0)	78 (4.1)
	平年比 (%)			117	95	105	75
	指標比 (%)			238	153	87	92
葉 数	本年値 (L)		5.2	6.3	6.0	2.9	4.7
	平年差 (L)			0.0	+0.3	-1.5	-0.6
	指標差 (L)			+1.1	+0.8	-2.3	-0.6

※指標比・差とは、目標とする理想的な生育値（指標値）に対する現在の生育値の割合・差

次回の情報提供は6月10日頃の予定です。