

令和7年度 糸魚川売れる米づくりコシヒカリ生育情報 No.3

令和7年6月19日
糸魚川農業普及指導センター

1 6月19日現在のコシヒカリの生育状況（指標値との比較）

田植日・調査ほ場	草丈	茎数	葉数	葉色
田植日 5月2～23日 ほ場場所 東海、西川原、東中、榎	やや短～並	並	並～やや早	やや淡～並

- 生育は順調に推移し、中干しによる生育調節が適宜行われています。
- 場所、移植時期の違いによる生育のほ場間差はありますが、高温多照傾向により生育がやや早いほ場も見られます。
- 現在、5月上旬植えでは第10葉、5月中旬植えでは第9葉の展開が進んでおり、盛んな分げつ発生により茎数の増加が進んでいます。

2 今後の管理について

- 生育調節をしっかり行うために、5月上旬～中旬頃までに田植えをしたほ場は、田面全体に小ヒビが入るまで中干しを継続し、その後、間断かん水を開始し、徐々に飽水管理に移行しましょう（大ヒビが入り田面が白くなるまで干すと根を傷めます）。
- 5月下旬に田植えをしたほ場も生育が進んでおり、田植え25日後をめどに遅れずに中干しを行いましょう。また、中干し効果を高めるため、溝切りを必ず行いましょう。
- 一部では雑草が目立つほ場が見られます。生育への影響とともに、ヒエやホタルイなどが残ることで本田内に斑点米カメムシ類を呼び込むこととなるので、必要に応じて後期剤での除草を行いましょう（使用にあたっては使用時期等除草剤の登録内容をよく確認して散布しましょう）。

3 6月19日のコシヒカリ生育調査結果

調査項目		ほ場場所 (田植日)	指標値 ※	東海 (5月2日)	西川原 (5月4日)	東中 (5月23日)	榎 (5月15日)
草 丈	本年値 (cm)	37	37	36	36	28	35
	平年比 (%)			89	102	83	98
	指標比 (%)			97	96	77	95
茎 数	茎数 (本/m ²) (一株当たり(本))	370	370	495 (26.9)	471 (26.9)	192 (10.4)	327 (17.3)
	平年比 (%)			94	110	57	87
	指標比 (%)			134	127	52	88
葉 数	本年値 (葉)	8.7	8.7	9.4	9.6	6.7	8.2
	平年差 (葉)			-0.1	+0.6	-1.5	-0.4
	指標差 (葉)			+0.7	+0.9	-2.0	-0.5
葉 色	本年値 (SPAD 値)	39.0	39.0	36.6	40.7	37.1	38.1
	平年差 (SPAD 値)			-2.7	+2.6	-2.3	-0.8
	指標差 (SPAD 値)			-2.4	+1.7	-1.9	-0.9

※指標比・差とは、目標とする理想的な生育値（指標値）に対する現在の生育値の割合・差
次回の情報提供は6月30日頃の予定です。